

Aus der Frauenklinik der Universität Jena.

über **Dauer-Resultate** nach **Prolaps - Operationen.**

Inaugural-Dissertation zur
Erlangung der Doctorwürde

in der
Medizin, Chirurgie und Geburtshilfe

der medizinischen Fakultät
der Universität Jena

vorgelegt von

Friedrich Thomsen

Medizinal - Praktikant am
Herzogl. Landkrankenhaus
zu Gotha.

Druck von J. W. LANG
Gotha :: :: 1907

Aus der Frauenklinik der Universität Jena.

über **Dauer-Resultate** nach **Prolaps - Operationen.**

Inaugural-Dissertation zur
Erlangung der Doctorwürde

in der
Medizin, Chirurgie und Geburtshilfe

der medizinischen Fakultät

der Universität Jena

vorgelegt von

Friedrich Thomsen

Medizinal - Praktikant am
Herzogl. Landkrankenhaus
zu Gotha.

Druck von J. W. LANG
Gotha :: :: 1907

Gedruckt mit Genehmigung der medizinischen Fakultät
der Universität Jena. Referent: der Unterzeichnete.

Jena, 19. Dezember 1907.

Prof. Dr. **Franz**,
d. Zt. Dekan.

Hierdurch versichere ich an Eidesstatt, daß ich die
vorliegende Arbeit im Auftrage des Herrn Prof. Dr. Krönig
und unter Anleitung des Herrn Privatdozent Dr. Pankow
selbständig angefertigt und keine weitere Beihilfe be-
nutzt habe.

Friedrich Thomsen.

Dem Andenken meiner Eltern
gewidmet.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Unter den Frauenleiden, die dem Arzt häufiger zu Gesicht kommen, sind es der Vorfall der Scheide und der des Uterus, die ein besonderes Interesse beanspruchen. Scheide und Uterus können infolge einer Erschlaffung der physiologischen Fixationen sowie der Organe selbst tiefer treten, sich senken. Wir sprechen dann, bei dem leichteren Grade dieser Senkung, von einem Descensus. Wird bereits die Portio in der Vulva sichtbar, so haben wir einen Prolaps vor uns. Der stärkste Grad des Tiefertretens läßt die Portio vor der Vulva erscheinen, Totalprolaps. Es liegt auf der Hand, daß vor allem Frauen, die geboren haben, einem Vorfall ausgesetzt sind, namentlich nach zu frühem Verlassen des Wochenbettes. Damm und Scheide erschlaffen durch das Durchtreten des kindlichen Kopfes, dazu kommt der Druck des puerperalen Uterus, und erst nach und nach verliert sich die Schläffheit wieder. Namentlich aber ist durch einen Dammriß ein aetiologisch wichtiges Moment geschaffen, da die natürliche Stütze im Beckenboden verloren geht. Andererseits ist es nicht selten der subinvolierte Uterus, der, durch die erschlafften Mutterbänder nicht genügend fixiert, herabsinkt und die Scheide mitzieht. Auch bei Virgines kann durch die Erschlaffung der physiologischen Fixationen mit gleichzeitiger Steigerung des abdominellen Druckes ein Uterusvorfall eintreten. Oft ist der Vorfall des Uterus auch durch Retroversion desselben begünstigt,

da in diesem Falle die Portio naturgemäß meistens tiefersteht. Dadurch entsteht eine Falte in der Vaginalschleimhaut und so kommt es zum Scheidenvorfall.

Die Beschwerden, die aus dem Bestehen eines Vorfalls resultieren, sind verschieden nach dem Grad des Leidens. Die Frauen klagen über Ziehen und Drängen nach unten. Es entstehen leicht Katarrhe der Scheide und des Uterus. An umgestülpten Schleimhautpartieen sieht man häufig Erosionen und Ulcerationen. Durch das Tiefertreten des Uterus kommt es zu Zerrungen an den Nachbarorganen, sodaß Reizzustände, nicht selten Entzündungen, hier die Folge sind. Auch Blase und Rectum werden leicht in Mitleidenschaft gezogen. Bei größerem Vorfall tritt ein Teil der unteren vorderen Rectumwand mit nach außen, es entsteht eine Rectocele. Die Folge ist erschwerte Defäcation. Analog kommt es zur Bildung der Cystocele durch Nachaußentreten des mit der vorderen Scheiden- und Cervixwand verbundenen Teils der Blase. Hier ist die Folge unvollkommene Entleerung der Blase, Urinstauung, schließlich Blasenkatarrh, dessen Übergreifen auf Ureteren und Nieren recht bedenklich werden kann.

Bei einem so unangenehmen, aber auch so häufigen Leiden ist die Auswahl der Therapie eine ebenso reichhaltige wie schwierige. Reichhaltig, weil ununterbrochen neue Vorschläge zur Therapie bei Vorfall der Scheide und der Gebärmutter erscheinen. Schwierig, weil selten ein Fall dem andern gleicht. Daher kommt da, wo operatives Eingreifen am Platze ist, eine einheitliche typische Operation nicht in Frage, sondern es muß individuell unter Berücksichtigung vieler Nebenumstände verfahren werden. Scheide und Uterus einer jungen Frau, bei der ein Prolaps im Puerperium entstanden ist, haben noch Aufgaben zu erfüllen und erfordern eine andere Therapie als der Prolaps einer Frau jenseits des Klimakteriums. Der Vorfall einer Frau, die

gezwungen ist, schwere Arbeit in unsauberer Umgebung zu verrichten, kann nicht behandelt werden wie der, bei dem Schonung und Fernhalten ungünstiger Einflüsse möglich ist. Es läßt sich also nicht durchführen, eine bestimmte Gruppe von Methoden bei operativer Behandlung ausschließlich auf eine bestimmte Gruppe von Vorfällen anzuwenden. Es ist vielmehr abzuwägen, welche Prolapsoperation in dem betreffenden Fall geeignet ist, der Wiederherstellung der physiologischen Verhältnisse möglichst nahe zu kommen, denn das Stadium integrum ist schwer zu erreichen, da wir auf künstliche Weise fixieren, was vorher natürlich fixiert war.

Pessare reichen bei größeren Vorfällen nicht aus und werden lästig. Hysterophore sind meistens beschwerlich und nützen selten. Die Behandlung nach Thure Brandt ist umständlich und nicht jedem zugänglich, auch sie schlägt häufig fehl.

Immer mehr geht man zur operativen Behandlung der Vorfälle der Gebärmutter und der Scheide über. Daß die Auswahl in der Therapie hier in der Tat eine schwierige ist, beweist die Mehrzahl der statistischen Berichte über Dauer-Resultate nach Prolapsoperationen. Zur Prüfung der Leistungsfähigkeit der verschiedenen Prolapsoperationen sind daher Berichte und Endergebnisse von Interesse.

Durch gütige Überlassung des Herrn Prof. Krönig standen mir 80 Fälle von Prolapsoperationen zur Verfügung, die in der Frauenklinik zu Jena in der Zeit vom 13. Januar 1903 bis zum 17. Juni 1904 ausgeführt worden sind. Nach den verschiedenen Principien lassen sie sich in 8 Gruppen einteilen wie folgt.

Es wurden ausgeführt:

1.	Kolporrhaphie und Kolpoperineoplastik	9
2.	Alexander - Adam'sche Operation und Kolporrhaphie	28
3.	Intraperitoneale Ligamentenverkürzung	5
4.	Einnähung des Uterus i. d. vord. Bauchwand . .	6
5. a)	Prolapsoperation n. Wertheim	15
b)	„ „ „ mit Modifikation	
	n. Doederlein	1
6.	Prolapsoperation n. Schauta	9
7.	Kolpokleisis n. Peter Müller	3
8.	Totalexstirpation per vaginam	4

Von diesen 80 Fällen konnten zum Zweck dieses Berichtes 56 nachuntersucht werden, also 70 %. Außer diesen 56 durch Nachuntersuchung festgestellten Resultaten gingen mir von 3 weiteren Fällen briefliche Berichte zu, deren Richtigkeit anzuzweifeln kein Grund vorliegt, wiewohl derartige subjektive Urteile nicht den Wert einer Nachuntersuchung haben können. Ich lasse nunmehr die Übersicht der gesamten Fälle folgen, um daran die Endergebnisse anzuschließen.

Nr.	N a m e	Alter	Aufge- nommen	Diagnose	Operation
1.	Knopf, Lina Kaufmannsfrau Saalfeld.	37.	6. I. 03.	Prolaps. vag. ant. " " post.	Kolporrhaphia ant. " post. Kolpoperineo- plastik.
2.	Schmidt, Marie Kohlenhändlers- frau Salzungen.	45.	26. I. 03.	Prolaps. uteri totalis.	Kolporrhaphia ant. " post. Kolpoperineo- plastik.
3.	Schröckel, Katharine Porzellan- müllersfrau Manebach.	40.	14. I. 03.	Prolaps. vag. post. Retroflexio uteri.	Alexander-Adam Kolporrhaphia post. Kolpoperineo- plastik.
4.	Rückert, Lina Wittwe Oelze b. Groß- breitenbach.	72.	16. IV. 03.	Prolaps. uteri totalis. Cystocele. Rectocele.	Wertheim. Kolpoperineo- plastik.
5.	Berthold, Marie Fabrikarbeiters- frau Langenwetzen- dorf.	37.	29. IV. 03.	Prolaps. vag. post.	Wertheim. Kolporrhaphia post.
6.	Büchel, Auguste Gutsbesitzers- tochter Trockenborn b. Hummelhain	32.	2. V. 03.	Prolaps. uteri totalis. Elongatio colli Cystocele.	Wertheim. Kolporrhaphia post.
7.	Lemmrich, Ida Wittwe Podelwitz.	54.	16. V. 03.	Descensus uteri. Retroversio-flexio uteri.	Wertheim.
8.	Wagner, Elisabeth Hofmeistersfrau Großneuhausen.	46.	11. V. 03.	Prolaps. vag. ant. " " post. Descensus uteri (gering). repuibl. Leisten- bruch. Alte Dammriß- narbe.	Wertheim. Herniotomia bilateralis.

Operiert	Ent- lassen	Erfolg	Nachuntersuchung	Resultat
13. I. 03.	2. II. 03.	geheilt.		
19. II. 03.	27. II. 03.	geheilt.		
19. II. 03.	15. III. 03.	geheilt.		
4. V. 03.	27. V. 03.	geheilt.		
9. V. 03.	4. VI. 03.	geheilt.		
12. V. 03.	1. VI. 03.	geheilt.		
19. V. 03.	10. VI. 03.	geheilt.	1. VII. 03. Auch bei stärk- stem Pressen wölben sich die Vaginalwände nicht vor. Corpus uteri überragt nur wenig das Niveau der vorderen Scheidenwand. Keine Beschwerden.	
23. V. 03.	17. VI. 03.	geheilt.	7. VII. 03. Scheidenwände völlig vernarbt. Uterus in die Höhe gezogen. 13. IX. 04. Herniennarben fest. Damm hoch. Auch bei starkem Pressen keine Vorwölbung. Ute- rus ganz flach der vorderen Vaginalwand an- liegend zu fühlen.	Kein Recidiv.

Nr.	N a m e	Alter	Aufge- nommen	Diagnose	Operation
9.	Plötner, Ida Landwirtschaftsfrau Schleifreisen.	34.	22. V. 03.	Prolaps. vag. ant. " " post. Descensus uteri. Retroflexio uteri.	Wertheim.
10.	Sänger, Bertha Landwirtschaftsfrau Beudnitz.	50.	25. V. 03.	Prolaps. vag. ant. " " post. Elongatio colli. Alte Dammriß- narbe.	Wertheim. Kolporrhaphia post.
11.	Stellenberg, Clara Wirtschafterin Buchfort b. Weimar.	38.	9. VI. 03.	Descens. vag. ant. " " post. Descensus uteri. Retroversio uteri. Elongatio colli.	Wertheim.
12.	Sänger, Pauline Arbeiterfrau Langenorla.	41.	8. VI. 03.	Prolaps. vag. ant. " " post. Neurasthenie. Hernia fem. dextr.	Schauta. Radicalop. d. Hernie.
13.	Römer, Minna Kutschersfrau Pößneck.	29.	16. VI. 03.	Prolaps. uteri totalis.	Schauta. Kolpoperineo- plastik.
14.	Wennig, Elise Lehrersfrau Neustadt a./Orla.	51.	18. VI. 03.	Prolaps. vag. ant. " " post. Descensus uteri.	Wertheim. Kolporrhaphia post.

Operiert	Ent- lassen	Erfolg	Nachuntersuchung	Resultat
28. V. 03.	5. VII. 03.	geheilt.	13. IX. 04. Bei stärkstem Pressen vordere Vaginalwand nur ganz wenig vorgewölbt. Uterus der vorderen Vaginalwand flach anliegend zu fühlen. Adnexe völlig frei.	Kein Recidiv.
30. V. 03.	25. VI. 03.	geheilt.	13. IX. 04. Vordere und hintere Vaginalwand absolut fest. Treten auch bei stärkstem Pressen nicht tiefer.	Kein Recidiv.
11. VI. 03.	9. VII. 03.	gebessert. Wieder- aufnahme 15. X. 03. Soolbäder, Massage. 14. XI. 03. „wesentlich gebessert“ entlassen.	3. XII. 03. Beim Pressen geringe Vortreibung. Allgemeine Mattigkeit. 17. IX. 04. Bei Husten und Pressen kein Hervortreten oder Vorwölben der Scheidenwände.	Kein Recidiv.
16. VI. 03.	22. VII. 03.	geheilt.	12. IX. 04. Die alten Beschwerden, Kopfschmerz, Schwindel usw. bestehen fort. Hernien-Recidiv. Sehr schöner fester Damm. In der vorderen Vaginalwand fühlt man das kleine Corpus uteri. Kein Descensus.	Kein Recidiv.
20. VI. 03.	11. VII. 03.	gebessert. Wieder- aufnahme 27. I. 04. Laue Voll- bäder und Abreibungen. 4. II. 04. auf Wunsch entlassen.		
20. VI. 03.	14. VII. 03.	geheilt.	13. IX. 04. Vordere Vaginalwand etwas descendiert. Damm hoch, fest.	Mittelbefund.

Nr.	N a m e	Alter	Aufge- nommen	Diagnose	Operation
15. Vergl. Nr. 71.	Klotz, Marie Färberei- arbeitsfrau Apolda.	47.	22. VI. 03.	Prolaps. uteri totalis.	Wertheim.
16.	Coriand, Lina Porzellan- drehersfrau Kahla.	32.	24. VI. 03.	Prolaps. vag. ant. " " post. Retroflexio uteri mob. Neurasthenie.	Alexander-Adam. Kolporrhaphia post.
17.	Kaufmann, Martha Köchin Apolda.	21.	1. VII. 03.	Prolaps. vag. ant. " " post. Descensus uteri.	Kolporrhaphia post. Salpingectomy bilateralis durch suprasymphysären Querschnitt.
18.	Geist, Alwine Handarbeits- frau Berka a./Ilm.	41.	27. VI. 03.	Prolaps. vag. ant.	Schauta. Kolpoperineo- plastik.
19.	Schmidt, Emma Hofmeistersfrau Schievelau b. Göschwitz.	36.	11. VII. 03	Prolaps. vag. ant. " " post. Descensus uteri.	Schauta. Kolpoperineo- plastik.
20.	Herold, Friederike Bergmannsfrau Ehrenstock.	28.	17. VII. 03.	Prolaps. vag. ant. " " post. Retroflexio uteri mob. Neurasthenie.	Alexander-Adam. Kolporrhaphia ant. " post.
21.	Fötsch, Sophie Kaufmannsfrau Niedertreba b. Sulza.	27.	13. VII. 03.	Prolaps. vag. ant. Descensus uteri Cystocele.	Alexander-Adam.

Operiert	Ent- lassen	Erfolg	Nachuntersuchung	Resultat
26. VI. 03.	31. VII. 03.	gebessert.	5. V. 04. Vollständiges Re- cidiv. Vgl. Nr. 71.	Recidiv.
29. VI. 03.	22. VIII. 03.	geheilt.	18. X. 03. Uterus retro- vertiert. Adnexe frei. Befinden gut. 21. IX. 04. Uterus retro- vertiert, anteponiert. Adnexe frei.	Kein Recidiv.
4. VII. 03.	25. VII. 03.	geheilt.	29. VIII. 03. Beschwerde- frei. Alles verheilt. Narbe normal, strich- förmig, nicht pigmen- tiert. Uterus anteflektiert. 14. IX. 04. Feste Narbe. Sehr fester Damm. Ute- rus anteflektiert. Vagi- nalwände wölben sich auch beim Pressen nicht vor.	Kein Recidiv.
7. VII. 03.	1. VIII. 03.	geheilt.	15. IX. 04. Uterus ante- flektiert, liegt der vor- dern Vaginalwand an. Die vordere Vaginal- wand wölbt sich beim Pressen stark vor.	Recidiv.
14. VII. 03.	9. VIII. 03.	geheilt.	14. IX. 04. Damm hoch und fest. Scheidenwand und Uterus wölben sich nicht vor.	Kein Recidiv.
28. VII. 03.	16. VIII. 03.	geheilt.		
31. VII. 03.	15. VIII. 03.	gebessert.		

Nr.	N a m e	Alter	Aufge- nommen	Diagnose	Operation
22.	Müller, Luise Zimmermanns- frau Krölpa.	31.	20. VII. 03.	Descensus uteri. Alter Dammriß. Neurasthenie.	Alexander-Adam. Kolpoperineo- plastik.
23.	Pöllner, Therese Wittwe Apolda.	65.	24. VII. 03.	Prolaps. vag. totalis. „ uteri „	Wertheim. Kolpoperineo- plastik.
24.	Ludwig, Rosa Lehrersfrau Oberrottenbach.	24.	3. VIII. 03.	Prolaps. vag. ant. „ „ post. Retroflexio uteri mob. Alter Dammriß. Neurasthenie.	Alexander-Adam. Kolpoperineo- plastik.
25.	Seyfarth, Luise Wittwe Blankenhain.	69.	26. VII. 03.	Prolaps uteri totalis. Cystocele. Rectocele.	Wertheim. Kolpoperineo- plastik.
26.	Stadermann, Anna Landarbeiterin Tonndorf b. Berka.	33.	5. VIII. 03.	Prolaps. uteri. vag. Cystocele. Hernia ing. dextr.	Wertheim. Vernähung d. auß. Leistenrings.
27.	Dröll, Emilie Schlossersfrau Havelberg b. Berlin.	47.	10. VIII. 03.	Prolaps uteri. „ vag. Cystocele. Rectocele.	Kolporrhaphia ant. Kolpoperineo- plastik.
28.	Moser, Bertha Invalidenfrau Weimar.	65.	25. VIII. 03.	Prolaps. uteri. „ vag.	Kolporrhaphia ant. Kolpoperineo- plastik.
29.	Gonnermann, Dorothea Landwirtsfrau Gehaus b. Lengsfeld.	36.	4. IX. 03.	Prolaps. uteri totalis.	Wertheim. Kolpoperineo- plastik.

Operiert	Ent- lassen	Erfolg	Nachuntersuchung	Resultat
1. VIII. 03.	26. VIII. 03.	geheilt.	12. X. 03. Uterus normal. 13. IX. 04. Narben fest. Damm hoch, fest. Uterus sehr schön anteflektiert. Auch bei stärkstem Pressen wölbt sich nichts vor.	Kein Recidiv.
1. VIII. 03.	23. VIII. 03.	geheilt.	24. IX. 03. Portio in der Vulva sichtbar. Seit vierzehn Tagen wieder Drängen nach unten. Uterus liegt anteflektiert der Scheide auf. 12. IX. 04. Beim Pressen tritt die Portio vor die Vulva.	Recidiv.
6. VIII. 03.	26. VIII. 03.	geheilt.		
6. VIII. 03.	1. IX. 03.	geheilt.	13. IX. 04. Descensus der hinteren Vaginalwand. Uterus und vordere Va- ginalwand bleiben oben.	Mittelbefund.
11. VIII. 03.	1. IX. 03.	geheilt. (quoad prolaps.)	14. IX. 04. Schenkelhernie rechts. Vordere Vaginal- wand straff. Wölbt sich auch bei starkem Pressen nicht vor.	Kein Recidiv.
25. VIII. 03.	16. IX. 03.	geheilt.	12. IX. 04. Brief: kein Re- cidiv.	Kein Recidiv.
27. VIII. 03.	16. IX. 03.	geheilt.	30. VI. 04. Beim Pressen tritt die Portio herab. 19. VIII. 04. stat. id.	Recidiv.
5. IX. 03.	3. X. 03.	geheilt.	13. IX. 04. Recidivum permagnum. Uterus mit vorderer Vaginalwand vorgetreten.	Recidiv.

Nr.	N a m e	Alter	Aufge- nommen	Diagnose	Operation
30.	Grunert, Martha Tischlersfrau Eisenberg.	30.	6. IX. 03.	Descens. vag. Retroflexio uteri mob. Alter Dammriß.	Alexander-Adam mit Tubensterilisation. Kolporrhaphia ant. Kolpoperineo- plastik.
31. Vergl. Nr. 58.	Graeßler, Lina Maurersfrau Saalfeld.	33.	15. IX. 03.	Prolaps. vag. ant. Retroflexio-versio uteri. Nabelhernie.	Wertheim. Radicalop. der Hernie.
32.	Dümmler, Anna Fabrikarbeits- frau Neukosewitz.	42.	27. VII. 03.	Prolaps. vag. ant. " " post	Schauta.
33.	Eisentraut, Alwine Mühlengehilfen- frau Wünschendorf b. Weida.	38.	30. IX. 03.	Prolaps. uteri. " vag. ant. " " post. Cystocele. Rectocele. Neurasthenie.	Intraperitoneale Ligamentenver- kürzung durch suprasymphysären Querschnitt. Salpingectomy bilat. Kolporrhaphia ant. Kolpoperineo- plastik.
34.	Muselmann, Auguste Kutschersfrau Ilmenau.	33.	5. X. 03.	Descens. uteri. " vag. ant. " " post. Alter Dammriß.	Alexander-Adam mit Tubensterilisation. Kolporrhaphia ant. Kolpoperineo- plastik.
35.	Bechmann, Liddy Porzellan- arbeitsfrau Triptis.	30.	11. X. 03.	Descens. vag. ant. " " post.	Kolporrhaphia ant. Kolpoperineo- plastik.
36.	Jecke, Minna Landwirtsfrau Rothenstein.	37.	13. X. 03.	Descens. vag. ant. " " post. Retroflexio ut. mob. Neurasthenie. Hysterie.	Alexander-Adam mit Tubensterilisation. Verschluß des ann. fem. Kolporrhaphia ant. Kolpoperineo- plastik.

Operiert	Ent- lassen	Erfolg	Nachuntersuchung	Resultat
8. IX. 03.	26. IX. 03.	geheilt.	14. IX. 04. Uterus schön anteflektiert. Scheiden- wände fest, nicht des- cendiert.	Kein Recidiv.
18. IX. 03.	11. X. 03.	gebessert.	3. XI. 03. Beim Pressen Descens. vag. 2. III. 04. Totalrecidiv. 5. III. 04. Vergl. Nr. 58.	Recidiv.
6. VIII. 03.	26. IX. 03.	gebessert.		
7. X. 03.	31. I. 04.	wesentlich gebessert.	14. IX. 04. Damm fest. Vagina wölbt sich nicht vor. Uterus stark ante- flektiert, etwas eleviert.	Kein Recidiv.
8. X. 03.	3. XI. 03.	geheilt.	14. IX. 04. Feste Narbe. Damm fest. Uterus anteflektiert. Beide Va- ginalwände wölben sich auch beim stärksten Pressen nicht vor.	Kein Recidiv.
14. X. 03.	11. XI. 03.	geheilt.	14. IX. 04. Fester hoher Damm. Uterus ante- flektiert. Vagina wölbt sich beim Pressen nicht vor.	Kein Recidiv.
22. X. 03.	12. XI. 03.	geheilt.		

Nr.	N a m e	Alter	Aufge- nommen	Diagnose	Operation
37.	Mensing, Minna Porzellandrehersfrau Elgersburg.	26.	12. IX. 03.	Prolaps. uteri. " vag. ant. " " post.	Vaginale Totalexstirpation sine adnexus durch vord. Kolpotomie. Kolpoperineoplastik.
38.	Kratz, Wilhelmine Pferdehändlers- frau Weimar.	57.	30. IX. 03.	Prolaps. uteri. " vag.	Kolpokleisis n. Peter Müller.
39.	Ritter, Dorothea Landwirtschwittwe Großrudstedt.	58.	22. X. 03.	Descens. vag. ant. Retroversio-flexio uteri.	Intraperitoneale Ligamenten- verkürzung durch suprasymphysär. Querschnitt. Kolporrhaphia ant. " post.
40.	Voigt, Auguste Klempnersfrau Rudolstadt.	30.	2. XI. 03.	Prolaps. vag. ant. Retroflexio ut. mob. Alter Dammriß. Neurasthenie.	Alexander-Adam mit Tubensterilisation. Kolporrhaphia ant. Kolpoperineoplastik.
41.	Venus, Amalie Rentnersfrau Jena.	61.	2. XI. 03.	Prolaps. vag. Desc. uteri.	Schauta. Kolpoperineoplastik.
42.	Ebert, Ida Schuhmachers- frau Blankenburg.	36.	10. XI. 03.	Prolaps. vag. ant. " " post. Retroflexio ut. mob. Neurasthenie.	Alexander-Adam mit Tubensterilisation. Kolporrhaphia ant. Kolpoperineoplastik.
43.	Franke, Meta Arbeiterin Jena.	34.	18. XI. 03.	Descens. vag. ant. " " post. Neurasthenie.	Intraperitoneale Ligamenten- verkürzung durch suprasymphysär. Querschnitt. Kolporrhaphia ant. Kolpoperineoplast.
44.	Meinzenbach, Christiane Landwirtsfrau Lauscha.	43.	24. XI. 03.	Descensus uteri. Descens. vag. ant. " " post.	Alexander-Adam. Kolpoperineoplastik.

Operiert	Ent- lassen	Erfolg	Nachuntersuchung	Resultat
22. X. 03.	9. XI. 03.	geheilt.	13. IX. 04. Brief: kein Recidiv.	Kein Recidiv.
24. X. 03.	13. XI. 03.	geheilt.		
27. X. 03.	18. XI. 03.	geheilt.	15. III. 04. Befund derselbe wie am 18. XI. 03.	Kein Recidiv.
7. XI. 03.	13. XII. 03.	geheilt.	12. IX. 04. Feste lücken- lose Narben, links etwas eingezogen. Uterus an- teflektiert, klein, derb, frei beweglich. Adnexe frei. Keine Beschwer- den.	Kein Recidiv.
11. XI. 03.	8. XII. 03.	geheilt.	11. V. 04. Heftiges Drängen. Neues Hervortreten. 13. IX. 04. Recidiv.	Recidiv.
14. XI. 03.	22. XII. 03.	geheilt.	14. IX. 04. Feste lücken- lose Narben, Uterus anteflektiert. Die vord. Vaginalwand tritt beim Pressen nach unten, Cystocete.	Mittelbefund.
21. XI. 03.	19. XII. 03.	geheilt.	14. IX. 04. Feste Narbe. Uterus anteflektiert Scheide auch beim Pres- sen nicht vorgewölbt.	Kein Recidiv.
28. XI. 03.	20. XII. 03.	geheilt.		

Nr.	Name	Alter	Aufge- nommen	Diagnose	Operation
45.	Rothe, Lina Handarbeiters- frau Teichwolframs- dorf.	38.	24. XI. 03.	Prolaps. vag. ant. " " post. Retroversio-flexio uteri. Neurasthenie.	Einnähung d. Fundus uteri i. d. vord. Bauchwand. Kolpoperineo- plastik.
46.	Sieler, Ida Fabrikarbeiterin Weida.	36.	7. XII. 03.	Prolaps. uteri totalis. " vag. " Alter Dammriß.	Schauta. Kolpoperineo- plastik.
47.	Wiedemann, Wilhelmine Landwirtswittwe Staitz.	60.	10. XII. 03.	Prolaps. uteri totalis. " vag. "	Kolpokleisis n. Peter Müller.
48.	Büchler, Barbara Handarbeiters- frau Weida.	40.	12. I. 04.	Descens. vag. Retroflexio uteri. Neurasthenie.	Alexander-Adam. Kolpoperineo- plastik.
49. Vergl. Nr. 68.	Heß, Emma Kaufmannsfrau Wenigenjena.	51.	2. I. 04.	Prolaps. uteri totalis.	Schauta. Kolpoperineo- plastik.
50.	Bärschneider, Bertha Zimmermanns- frau Eichicht.	35.	13. I. 04.	Prolaps. uteri. Cystocele.	Alexander-Adam mit Tubensterilisation. Kolporrhaphia ant. Kolpoperineo- plastik.
51.	Böttcher, Auguste Arbeitsfrau Jena.	40.	13. I. 04.	Prolaps. vag. ant. Cystocele Descens. uteri. Alter Dammriß.	Alexander-Adam. Kolporrhaphia ant. Kolpoperineo- plastik.
52.	Kögel, Klara Schuhmachers- frau Mittelhausen.	31.	11. I. 04.	Descens. uteri. " vag. Subinvolutio post. partum. Alter Dammriß.	Alexander-Adam mit Tubensterilisation. Kolporrhaphia ant. Kolpoperineo- plastik.
53.	Tietzel, Klara Schornstein- fegersfrau Pößneck.	27.	14. I. 04.	Prolaps. uteri totalis. " vag. "	Alexander-Adam mit Tubensterilisation. Kolporrhaphia ant. Kolpoperineo- plastik.

Operiert	Ent- lassen	Erfolg	Nachuntersuchung	Resultat
3. XII. 03.	22. XII. 03.	geheilt.	13. IX. 04. Feste Bauch- narbe. Damm fest. Ute- rus anteflektiert.	Kein Recidiv.
15. XII. 03.	11 I. 04.	geheilt.	14. IX. 04. Brief: Recidiv.	Recidiv.
15. XII. 03.	10. I. 04.	geheilt.	13. IX. 04. Scheide völlig vernarbt. Keine Senk- ung.	Kein Recidiv.
14. I. 04.	7. II. 04.	geheilt.	14. IX. 04. Patientin ist Gravida im VI.—VII. Monat. Narben fest. Damm hoch und fest.	Kein Recidiv.
14. I. 04.	6. II. 04.	geheilt.	27. IV. 04. Alter Status. Vergl. Nr. 68.	Recidiv.
19. I. 04.	21. II. 04.	geheilt.		
20. I. 04.	11. II. 04.	geheilt.	12. IX. 04. Feste Narben. Dammnarbe fest. Ute- rus schön anteflektiert. Bei starkem Pressen tritt die vord. Vaginal- wand ganz wenig hervor.	Kein Recidiv.
21. I. 04.	14. II. 04.	geheilt.	14. IX. 04. Narben fest. Vaginalwände wölben sich beim Pressen nicht vor.	Kein Recidiv.
23. I. 04.	11. II. 04.	geheilt.		

Nr.	N a m e	Alter	Aufge- nommen	Diagnose	Operation
54.	Friedrich, Wilhelmine Schneidersfrau Jena.	68.	3. II. 04.	Prolaps. vag. ant. Cystocele. Hysterie.	Kolporrhaphia ant.
55.	Hemmann, Hedwig Schutzmanns- frau Gera (Reuß).	27.	11. II. 04.	Descens. vag. ant. Retroflexio ut. mob. Neurasthenie.	Alexander-Adam. Kolporrhaphia ant.
56.	Martin, Elise Tischlersfrau Camburg.	31.	10. II. 04.	Prolaps. vag. ant. Retroflexio uteri mob. Alter Dammriß. Neurasthenie.	Alexander-Adam mit Tubensterilisation. Kolpoperineo- plastik.
57.	Bormann, Auguste Bäckerswitwe Apolda.	33.	9. II. 04.	Descens. uteri. Appendicitis chron.	Intraperitoneale Ligamenten- verkürzung durch suprasymph. Querschnitt. Resectio proc. verm.
58. Vergl. Nr. 31.	Graefler, Lina Maurersfrau Saalfeld.	33.	2. III. 04.	Prolaps. uteri totalis. (Recidiv nach Wertheim'scher Prolaps-Operation.)	Exstirpatio uteri totalis sine adnexis. Kolporrhaphia ant. Kolpoperineo- plastik.
59.	Lisker, Melanie Agentenfrau Iversgehofen b. Erfurt.	34.	14. III. 04.	Descens. uteri. Prolaps. vag. Neurasthenie.	Alexander-Adam. Kolpoperineo- plastik.
60.	Klemm, Olga Ökonomsfrau Quaschwitz b. Saalfeld.	32.	13. III. 04.	Prolaps. uteri totalis. Cystocele.	Wertheim mod. n. Doederlein. Kolpoperineo- plastik.
61.	Schwedler, Emilie Weichen- stellersfrau Oberweimar.	38.	23. III. 04.	Prolaps. vag. Descens. uteri.	Alexander-Adam. Kolporrhaphia ant. " post. Kolpoperineo- plastik.

Operiert	Ent- lassen	Erfolg	Nachuntersuchung	Resultat
9. II. 04.	25. II. 04.	geheilt.		
13. II. 04.	2. III. 04.	geheilt.	13. IV. 04. Uterus sehr schön anteflektiert. Adnexe frei. 13. IX. 04. Feste Narben. Uterus sehr schön anteflektiert. Nicht descendiert.	Kein Recidiv.
19. II. 04.	13. III. 04.	geheilt.	14. IX. 04. Sehr hoher fester Damm. Uterus schön anteflektiert, frei beweglich.	Kein Recidiv.
22. II. 04.	17. III. 04.	geheilt.	4. V. 04. Uterus anteflektiert, frei beweglich, Adnexe frei; Schwäche, Nervosität. 12. IX. 04. Befinden weiterhin gebessert. Narbe fest. Genitalbefund normal. Uterus anteflektiert. Kein Descensus.	Kein Recidiv.
5. III. 04.	31. III. 04.	geheilt.	13. IX. 04. Scheidennarbe fest. Vaginalwand leicht vorgetrieben, wölbt sich aber beim Pressen nicht weiter vor.	Kein Recidiv.
18. III. 04.	9. IV. 04.	geheilt.		
19. III. 04.	10. IV. 04.	geheilt.	14. IX. 04. Damm hoch, fest. Vord. Vaginalwand und Uterus bei starkem Pressen wenig descendiert.	Kein Recidiv.
25. III. 04.	24. IV. 04.	geheilt.	13. IX. 04. Feste Narben, lückenlos. Damm fest. Uterus anteflektiert.	Kein Recidiv.

Nr.	N a m e	Alter	Aufge- nommen	Diagnose	Operation
62.	Franke, Mathilde Fabrikarbeiters- frau Horia.	29.	24. III. 04.	Descens. uteri. Alter Dammriß. Neurasthenie. Hysterie.	Alexander-Adam. Kolpoperineo- plastik.
63.	Köhler, Auguste Landwirtschafts- frau Kleinrudestedt.	37.	25. III. 04.	Descens. uteri. Retroversio „ Neurasthenie.	Alexander-Adam.
64.	Zimmermann, Anna Viehhändlers- frau Neustadt a/Orla.	50.	6. IV. 04.	Prolaps. vag. ant. „ „ post. Descens. uteri. Cystocele.	Alexander-Adam. Kolporrhaphia ant. Kolpoperineo- plastik.
65.	Carnarius, Auguste Landwirtschafts- frau Großschwab- hausen.	59.	5. IV. 04.	Prolaps. uteri totalis.	Kolpopleisis n. Peter Müller.
66.	Weber, Agnes Fleischersfrau Berka a/Ilm.	31.	18. IV. 04.	Prolaps. vag. Descens. uteri. Neurasthenie.	Alexander-Adam mit Tubensterilisation. Kolporrhaphia ant. Kolpoperineo- plastik.
67.	Eidam, Johanne Porzellan- arbeitersfrau Ehrenstock b. Ilmenau.	53.	24. IV. 04.	Prolaps. vag. Descens. uteri.	Kolporrhaphia ant. Kolpoperineo- plastik.
68. Vergl. Nr. 49.	Heß, Emma Kaufmannsfrau Wenigenjena.	51.	27. IV. 04.	Prolaps. uteri totalis. (Recidiv nach Schauta'scher Prolapsoperation.)	Totalexstirpation per vaginam sine adnexis n. Doederlein.

Operiert	Ent- lassen	Erfolg	Nachuntersuchung	Resultat
26. III. 04.	8. V. 04.	wesentlich gebessert.	14. IX. 04. Uterus ante- flektiert. Narben fest. Ebenso Damm.	Kein Recidiv.
29. III. 04.	1. V. 04.	gebessert.	12. VI. 04. Uterus sehr schön anteflektiert. Ad- nexe frei. 12. IX. 04. Feste lücken- lose Narben. Uterus anteflektiert, klein, derb, frei beweglich. Adnexe frei.	Kein Recidiv.
8. IV. 04.	5. V. 04.	geheilt.	12. IX. 04. Vord. Vaginal- wand descendiert. Ute- rus retrovertiert. Cysto- cele. Recidivum inci- piens.	Recidiv.
21. IV. 04.	14. V. 04.	geheilt.	14. VI. 04. Keine Be- schwerden. Beim Pres- sen kein Vortreten. 13. IX. 04. Narbe völlig vernarbt. Auch bei stärkstem Pressen keine Senkung.	Kein Recidiv.
22. IV. 04.	13. V. 04.	geheilt.		
30. IV. 04.	19. V. 04.	geheilt.		
30. IV. 04.	21. V. 04.	geheilt.	20. VII. 04 Vord. Vaginal- wand tritt tiefer, Cysto- cele. 12. IX. 04. Fester glatter Damm. Vord. Vaginal- wand wölbt sich beim Pressen stark vor.	Mittelbefund.

Nr.	N a m e	Alter	Aufge- nommen	Diagnose	Operation
69.	Steiniger, Ida Zimmermanns- frau Ronneburg.	42.	28. IV. 04.	Prolaps uteri totalis.	Schauta. Kolpoperineo- plastik.
70.	Höfer, Luise Drechstlersfrau Bürgel.	38.	3. V. 04.	Prolaps. vag. Descens. uteri. Myoma uteri.	Enucleation eines wallnußgroßen Myoms der Vorderwand. Kolpoperineo- plastik.
71. Vergl. Nr. 15.	Klotz, Marie Fabrikarbeiters- frau Apolda.	47.	22. IV. 04.	Prolaps. uteri totalis. (Recidiv nach Wertheim'scher Prolapsoperation.)	Exstirpatio uteri sine adnexis per vaginam. Kolporrhaphia ant. Kolpoperineo- plastik.
72.	Leser, Lina Handarbeiters- witwe Ossmannstedt b. Apolda.	42.	9. V. 04.	Prolaps. vag. Descens. uteri. Neurasthenie. Hysterie.	Einnähung d. Fundus uteri i. d. vord. Bauchwand. Kolporrhaphia ant. " post. Kolpoperineo- plastik.
73.	Zaubitzer, Lina Landwirtsfrau Isserstedt.	39.	1. V. 04.	Prolaps. vag. Descens. uteri. Neurasthenie. Hysterie.	Einnähung d. Fundus uteri i. d. vord. Bauchwand. Kolporrhaphia ant. " post. Kolpoperineo- plastik.
74.	Franke, Anna Fabrikarbeiters- frau Weida.	40.	25. V. 04.	Prolaps. vag. ant. Descens. uteri. Cystocele. Neurasthenie. Hysterie.	Alexander-Adam. Kolporrhaphia ant.

Operiert	Ent- lassen	Erfolg	Nachuntersuchung	Resultat
3. V. 01.	21. V. 04.	geheilt.	12. IX. 04. Pat. ist noch nicht wieder völlig arbeitsfähig. Der Uterus liegt der vord. Scheidenwand breit an. Auch bei starkem Pressen tritt nur der Harnröhrenwulst tiefer, nicht aber die vord. Scheidenwand und Uterus. Damm fest.	Kein Recidiv.
5. V. 04.	28. V. 04.	geheilt.	14. IX. 04. Damm fest, wölbt sich nicht vor.	Kein Recidiv.
10. V. 04.	2. VI. 04.	geheilt.	15. IX. 04. Sehr hoher und sehr fester Damm.	Kein Recidiv.
17. V. 04.	8. VI. 04.	geheilt.	24. VIII. 04. Feste lückenlose Narbe, strichförmig. Uterus: d. vord. Bauchwand gut zu tasten. 13. IX. 04. Uterus in der vord. Bauchwand breit adhaerent. Vord. und hintere Kolporrhaphie gut verheilt.	Kein Recidiv.
18. V. 04.	1. VI. 04.	geheilt.	12. IX. 04. Uterus in der Bauchwand als flacher Wulst zu tasten. Die Vagina wölbt sich auch beim stärksten Pressen nicht vor.	Kein Recidiv.
30. V. 04.	3. VII. 04	geheilt.	13. IX. 04. Feste lückenlose Narben. Uterus anteflektiert. Auch beim stärksten Pressen senkt sich die Scheide nicht.	Kein Recidiv.

Nr.	Name	Alter	Aufge- nommen	Diagnose	Operation
75.	Sieger, Emilie Maschinen- putzersfrau. Jena.	28.	30. V. 04.	Prolaps. vag. ant. " " post. Descens. uteri.	Einnähen d. Fundus i. d. vord. Bauchwand. Kolporrhaphia ant. Kolpoperineo- plastik.
76.	Öhlschlägel, Alma Kaufmannsfrau Neustadt a/Orla.	26.	3. VI. 04.	Prolaps. vag. ant. Descens. uteri. Retroversio " Alter Dammriß.	Alexander-Adam mit Tubensterilisation.
77.	Friedrich, Anna Uhrmachersfrau Jena.	34.	6. VI. 04.	Prolaps. vag. ant. " " post. Descens. uteri. Alter Dammriß.	Intraperitoneale Ligamenten- verkürzung. Resectio proc. verm. Kolporrhaphia ant. Kolpoperineo- plastik.
78.	Lüdecke, Hedwig Branntwein- fabrikantens- wittwe Salzungen.	55.	3. VI. 04.	Prolaps. vag. Descens. uteri.	Einnähung d. Fundus uteri i. d. vord. Bauchwand. Kolporrhaphia ant. Kolpoperineo- plastik.
79.	Hartwig, Christiane Glasbläusersfrau Gera b. Elgersburg.	40.	1. VI. 04.	Descens. uteri. Prolaps. vag. post. Neurasthenie Hysterie.	Alexander-Adam mit Tubensterilisation. Kolporrhaphia ant. Kolpoperineo- plastik.
80.	Schönfeld, Minna Landwirtsfrau Hengelsbach.	33.	9. VI. 04.	Prolaps. uteri totalis.	Einnähung d. Fundus uteri i. d. vord. Bauchwand. Kolporrhaphia ant. Kolpoperineo- plastik.

Operiert	Ent- lassen	Erfolg	Nachuntersuchung	Resultat
2. VI. 04.	25. VI. 04.	geheilt.	13. IX. 04. Glatte feste strichförmige Narbe. Uterus liegt der vord. Bauchwand breit an. Hoher und fester Damm. Auch bei stärkstem Pressen kein Descensus.	Kein Recidiv.
7. VI. 04.	29. VI. 04.	geheilt.	13. IX. 04. Fester hoher Damm. Uterus schön anteflektiert.	Kein Recidiv.
9. VI. 04.	29. VI. 04.	geheilt.	16. IX. 04. Feste lückenlose Narbe. Damm fest. Vagina wölbt sich beim Pressen nicht vor.	Kein Recidiv.
9. VI. 04.	1. VII. 04.	geheilt.	13. IX. 04. Damm sehr fest, hoch. Uterus in der vord. Bauchwand.	Kein Recidiv.
17. VI. 04.	6. VII. 04.	geheilt.	16. IX. 04. Feste Narben. Damm hoch, fest. Uterus schön anteflektiert. Auch bei stärkstem Pressen wölbt sich nichts vor.	Kein Recidiv.
17. VI. 04.	6. VII. 04.	geheilt.	13. IX. 04. Uterus fest in der vord. Bauchwand. Auch beim stärksten Pressen wölbt sich nichts vor.	Kein Recidiv.

Der Übersichtlichkeit halber lasse ich gleichfalls tabellarisch zusammengestellt die Resultate der einzelnen Fälle nach Operationen wie oben geordnet folgen.

1. Kolporrhaphie und Kolpoperineoplastik.

	Nr.			
1.	35.	Bechmann	Descens. vag. ant. post.	Kein Recidiv.
2.	27.	Dröll	Prolaps. vag. Prolaps. uteri.	Kein Recidiv.
3.	67.	Eidam	Prolaps. vag. Descens uteri.	
4.	54.	Friedrich, W.	Prolaps. vag.	
5.	70.	Höfer	Prolaps. vag. Descens. uteri.	Kein Recidiv.
6.	17.	Kaufmann	Prolaps. vag. Descens. uteri.	Kein Recidiv.
7.	1.	Knopf	Prolaps. vag.	
8.	28.	Moser	Prolaps. uteri. Descens. uteri.	Recidiv.
9.	2.	Schmidt, M.	Prolaps. uteri totalis.	

2. Alexander-Adam'sche Operation und Kolporrhaphie.

	Nr.			
1.	50.	Bärschneider	Prolaps. uteri.	
2.	51.	Böttcher	Descens. uteri. Prolaps. vag.	Kein Recidiv.
3.	48.	Büchler	Descens. vag.	Kein Recidiv.
4.	16.	Coriand	Prolaps. vag.	Kein Recidiv.
5.	42.	Ebert	Prolaps. vag.	Mittelbefund.
6.	21.	Fötsch	Descens. uteri. Prolaps. vag.	
7.	74.	Franke, A.	Descens. uteri. Prolaps. vag.	Kein Recidiv.
8.	62.	Franke, M.	Descens. uteri.	Kein Recidiv.
9.	30.	Grunert	Descens. vag.	Kein Recidiv.
10.	79.	Hartwig	Descens. uteri. Prolaps. vag.	Kein Recidiv.
11.	55.	Hemmann	Descens. vag.	Kein Recidiv.
12.	20.	Herold	Prolaps. vag.	
13.	36.	Jecke	Descens. vag.	
14.	52.	Kögel	Descens. vag.	Kein Recidiv.

	Nr.			
15.	63.	Köhler	Descens. uteri.	Kein Recidiv.
16.	59.	Lisker	Descens. uteri. Prolaps. vag.	
17.	24.	Ludwig	Prolaps. vag.	
18.	56.	Martin	Prolaps. vag.	Kein Recidiv.
19.	44.	Meinzenbach	Descens. uteri.	
20.	22.	Müller	Descens. uteri.	Kein Recidiv.
21.	34.	Muselmann	Descens. uteri.	Kein Recidiv.
22.	76.	Öhlschlägel	Descens. uteri. Prolaps. vag.	Kein Recidiv.
23.	3.	Schrickel	Prolaps. vag.	
24.	61.	Schwedler	Descens. uteri. Prolaps. vag.	Kein Recidiv.
25.	53.	Tietzel	Prolaps. uteri totalis.	
26.	40.	Voigt	Prolaps. vag.	Kein Recidiv.
27.	66.	Weber	Descens. uteri. Prolaps. vag.	
28.	64.	Zimmermann	Descens. uteri. Prolaps. vag.	Recidiv.

3. Intraperitoneale Ligamentenverkürzung.

	Nr.			
1.	57.	Bormann	Descens. uteri.	Kein Recidiv.
2.	33.	Eisentraut	Prolaps. vag. Prolaps. uteri.	Kein Recidiv.
3.	43.	Franke, M.	Descens. vag.	Kein Recidiv.
4.	77.	Friedrich, A.	Prolaps. vag.	Kein Recidiv.
5.	39.	Ritter	Descens. vag.	Kein Recidiv.

4. Einnähung des Uterus i. d. vord. Bauchwand.

1.	72.	Leser	Prolaps. vag. Descens. uteri.	Kein Recidiv.
2.	78.	Lüdecke	Prolaps. vag. Descens. uteri.	Kein Recidiv.
3.	45.	Rothe	Prolaps. vag.	Kein Recidiv.
4.	80.	Schönfeld	Prolaps. uteri totalis.	Kein Recidiv.
5.	75.	Sieger	Prolaps. vag. Descens. uteri.	Kein Recidiv.
6.	73.	Zaubitzer	Prolaps. vag. Descens. uteri.	Kein Recidiv.

5. Prolapsoperation n. Wertheim.

	Nr.			
1.	5.	Berthold	Prolaps. vag.	
2.	6.	Büchel	Prolaps. uteri.	
3.	29.	Gounermann	Prolaps. uteri.	Recidiv.
4.	31.	Graeßler	Prolaps. vag.	Recidiv.
5.	60.	Klemm	Prolaps. uteri.	Kein Recidiv.
6.	7.	Lemmrich	Descens. uteri.	
7.	9.	Plötner	Descens. uteri. Descens. vag.	Kein Recidiv.
8.	23.	Pöllner	Prolaps. uteri et vag. totalis.	Recidiv.
9.	4.	Rückert	Prolaps. uteri totalis.	
10.	10.	Sänger, B.	Prolaps. vag.	Kein Recidiv.
11.	25.	Seyfarth	Prolaps. uteri totalis.	Mittelbefund.
12.	26.	Stadermann	Prolaps. uteri. Prolaps. vag.	Kein Recidiv.
13.	11.	Stellenberg	Descens. uteri. Descens. vag.	
14.	8.	Wagner	Descens. uteri. Prolaps. vag.	Kein Recidiv.
15.	14.	Wennig	Descens. uteri. Prolaps. vag.	Mittelbefund.
16.	15.	Klotz	Prolaps. uteri totalis.	Recidiv.

6. Prolapsoperation n. Schauta.

	Nr.			
1.	32.	Dümler	Prolaps. vag. ant. post.	
2.	18.	Geist	Prolaps. vag.	Recidiv.
3.	49.	Heß	Prolaps. uteri totalis.	Recidiv.
4.	12.	Sänger, P.	Prolaps. vag.	Kein Recidiv.
5.	19.	Schmidt, E.	Descens. uteri. Prolaps. vag.	Kein Recidiv.
6.	46.	Sieler	Prolaps. uteri totalis.	Recidiv.
7.	69.	Steiniger	Prolaps. uteri totalis.	Kein Recidiv.
8.	41.	Venus	Prolaps. vag.	Recidiv.
9.	13.	Römer	Prol. uteri tot. Prol. vag. tot.	

7. Kolpokleisis n. Peter Müller.

	Nr.			
1.	65.	Carnarius	Prolaps. uteri.	Kein Recidiv.
2.	38.	Kratz	Prolaps. vag. Prolaps. uteri.	
3.	47.	Wiedemann	Prol. vag. tot. Prol. uteri tot	Kein Recidiv.

8. Totalexstirpation per vaginam.

	Nr.			
1.	58.	Graeßler	Prolaps. uteri totalis.	Kein Recidiv.
2.	68.	Heß	Prolaps. uteri totalis.	Mittelbefund.
3.	71.	Klotz	Prolaps. uteri totalis.	Kein Recidiv.
4.	37.	Mensinger	Prolaps. uteri.	Kein Recidiv.

Die oben erwähnten 3 brieflichen Berichte, von denen einer ein Recidiv meldet (Nr. 46, Schauta), zwei Resultate ohne Recidive (Nr. 27, Kolporrhaphie und Nr. 37, Totalexstirpation), entsprechend eingereiht, ergiebt folgende Übersicht:

		Operiert	Nachunter- sucht	Recidiv	Kein Recidiv
1.	Kolporrhaphie	9	5	1	4
2.	Alexander-Adam	28	18	1	17
3.	Intraper. Lig.-Verkürzung	5	5	—	5
4.	Einnähung i. d. vord. Bauchw.	6	6	—	6
5.	Wertheim	16	12	4	8
6.	Schauta	9	7	4	3
7.	Kolpokleisis n. P. Müller	3	2	—	2
8.	Totalexstirpation	4	4	—	4

Nach dem Prozentsatz der Recidive geordnet erhalten wir folgende Reihenfolge:

		Nachunter- sucht	Recidiv	Kein Recidiv	Prozentsatz der Recidive
1.	Einnähung i. d. vord. Bauchw.	6	—	6	— 0/0
2.	Intraper. Ligt.-Verkürzung	5	—	5	— 0/0
3.	Totalexstirpation	4	—	4	— 0/0
4.	Kolpokleisis n. P. Müller	2	—	2	— 0/0
5.	Alexander-Adams	18	1	17	5,5 0/0
6.	Kolporrhaphie	5	1	4	20 0/0
7.	Wertheim	12	4	8	33,3 0/0
8.	Schauta	7	4	3	57,2 0/0

Die vorliegende Statistik kann betreffs der Zahl der zur Verfügung stehenden Fälle nur ein Beitrag zur Prüfung der Leistungsfähigkeit der verschiedenen in Betracht kommenden Prolaps-Operationen sein. Die günstigsten Resultate ergeben Einnähung in die vordere Bauchwand, Intraperitoneale Ligamentverkürzung, Total-exstirpation und Kolpokleisis nach P. Müller, sämtlich recidivfrei. Weniger günstige Erfolge ergaben sich nach der Alexander-Adam'schen Operation und Kolporrhaphie, erstere 5,5 0/0, letztere 20 0/0 Recidive. Die ungünstigsten Resultate ergaben die Wertheim'sche mit 33,3 0/0 und die Schauta'sche Operation mit 57,2 0/0 Recidiven.

Die Anzahl der von jedem einzelnen Operationstyp in dieser Statistik vertretenen Resultate ist sehr verschieden, so Alexander-Adam 18, Kolpokleisis 2. Auch dieser Umstand, außer der Beschränkung des Materials an sich, macht die vorliegende Arbeit, weit entfernt davon, ausschlaggebend zu sein, nur zu einem Beitrag zu dem wichtigen Gebiet der Prolaps-Operationen.

Zum Schluß erfülle ich die angenehme Pflicht, Herrn Professor Dr. Krönig für gütige Überlassung des Themas sowie Herrn Privatdocent Dr. Pankow für bereitwillige Unterstützung bei den Nachuntersuchungen meinen ergebensten Dank auszusprechen. Angefertigt habe ich die vorliegende Arbeit allein, ohne fremde Hilfe, was ich hiermit eidesstattlich versichere.

Lebenslauf.

Ich, Friedrich Ludwig Thomsen, evangelischer Konfession, wurde am 22. April 1874 in Dresden geboren als Sohn des Kaufmanns Gustav Thomsen und dessen Ehefrau Adelaide geb. Christophers. Nachdem ich Ostern 1893 die Reifeprüfung am Königl. Gymnasium zu Leipzig bestanden hatte, widmete ich mich dem Studium der Medizin. Während meiner Studienzeit besuchte ich die Universitäten Leipzig — wo ich das Physicum bestand, — Kiel, Berlin — wo ich meiner militärischen Dienstpflicht als Einjähriger beim III. Garde-Regiment genügte, — Göttingen, Greifswald, Halle und Jena. Hier bestand ich am 28. Dezember 1906 das medizinische Staatsexamen, trat zur Ableistung des praktischen Jahres als Medizinal-Praktikant am 1. Februar 1907 am Herzogl. Landkrankenhaus zu Gotha ein und bestand die medizinische Doctorprüfung in Jena am 19. Dezember 1907.

